

Perioperatives Management chirurgischer Patienten unter Thrombozytenaggregationshemmern

			CEREBRO- UND KARDIOVASKULÄRES RISIKO		
			TIEF BIS MITTEL	HOCH	SEHR HOCH
			„Primäre Prävention“ Allg. Atherosklerose <u>ohne</u> dokumentierte KHK CVD PAVK	Dokumentierte KHK gem. Risikostratifizierung stabil St. n. Myokardinfarkt > 1 Mt Koronarstenting > 1 Monate (BMS) > 12 Monate (DES) St. n. AKB > 6 Wochen St. n. CVI / TIA > 1 Monate PAVK	Dokumentierte KHK gem. Risikostratifizierung instabil St. n. Myokardinfarkt < 1 Mt Koronarstenting < 1 Monate (BMS) < 12 Monate (DES) St. n. AKB < 6 Wochen St. n. CVI / TIA < 1 Monate
GEFÄHRlichkeit VON BLUTUNGSKOMPLIKATIONEN	GERING	Handchirurgie Augenchirurgie TUR-P (Laser) Hautchirurgie	ASS unverändert weitergeben	ASS unverändert weitergeben Falls Clopidogrel weiterhin verordnet: Indikation abklären und individuell besprechen	Eingriff wenn immer möglich verschieben. ASS und Clopidogrel unverändert weitergeben
	MITTEL	Viszeralchirurgie Gynäkologie Ortho. Chirurgie HNO, Urologie Lungenchirurgie Gefässchirurgie	ASS 7 Tg. präop absetzen, ab 2.-3. postop. Tg. weitergeben	ASS unverändert weitergeben. Falls Clopidogrel weiterhin verordnet: Indikation abklären und individuell besprechen	Eingriff wenn immer möglich verschieben Falls nicht möglich: interdisziplinäre Besprechung
		Herzchirurgie	ASS 7 Tg. präop absetzen, ab 1. postop. Tg. weitergeben	ASS unverändert weitergeben Falls Clopidogrel weiterhin verordnet: Indikation abklären und individuell besprechen	ASS unverändert weitergeben Clopidogrel nicht absetzen, am Op.Tg nicht geben. (Postop. nur in Absprache mit Operateur weitergeben)
	HOCH	WS-Chirurgie Leberchirurgie	ASS 7 Tg. präop absetzen, ab 3.- 4. postop. Tg. weitergeben	ASS 3 Tg. präop absetzen, ab 1.-2. postop. Tg. weitergeben. Falls Clopidogrel weiterhin verordnet: Indikation abklären und individuell besprechen	Eingriff wenn immer möglich verschieben Falls nicht möglich: interdisziplinäre Besprechung
	SEHR HOCH	Intrakranielle Chirurgie	ASS 7 Tg. präop absetzen, ab 4.- 5. postop. Tg. Weitergeben Bei chronischem Subduralhämatom 6 Wochen Pause	ASS 5 Tg. präop absetzen, ab 2.-3. postop. Tg. weitergeben Falls Clopidogrel weiterhin verordnet: Indikation abklären und individuell besprechen	Eingriff wenn immer möglich verschieben Falls nicht möglich: interdisziplinäre Besprechung

Abkürzungen: AKB: Aortokoronare Bypass-Operation; ASS: Acetylsalizylsäure; BMS: Bare Metal Stent (z.B. Vision); CVD: Atherosklerose der Hirnversorgenden Gefässe („Cerebrovascular disease“); CVI: Cerebrovasculärer Insult; DES: Drug Eluting Stent (z.B. Cypher, Taxus, Xience, Endeavor); KHK: Koronare Herzkrankheit; PAVK: Peripher-arterielle Verschlusskrankheit; TIA: Transient-ischämische Attacke; WS: Wirbelsäule